

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
DLP 23-8-72 4 ~~TECHNIQUE~~  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU-CHARENTES  
CHARENTE, CHARENTE-MARITIME, DEUX-SÈVRES, VIENNE

12, rue Victor-Hugo - EC - POITIERS - Tél. (49) 41.35.55

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F.  
C. C. P. LIMOGES 4.752.22 VI.  
Sous Régisseur de recettes et d'avances  
AVERTISSEMENTS AGRICOLES  
12, rue Victor-Hugo - 86 - POITIERS

BULLETIN N° 143 - Supplément N° 1 - AOUT 1972

VIGNE

## MILDIOU

Afin d'assurer une bonne maturation des grappes et des sarments il est conseillé d'effectuer un traitement dans tous les vignobles avec un fongicide à longue persistance d'action. Ce traitement (le dernier dans les vignobles en production rognés) sera réalisé dans le courant de la semaine. Dans les jeunes plantations où la végétation reste active en arrière saison, la protection du feuillage sera continuée en septembre.

## BLACK-ROT

En raison des pluies du 7 au 15 Août et du développement des grappes, il convient de renouveler la protection dès réception si aucun traitement n'a été effectué depuis le 15 Août.

Nous rappelons que les attaques de Black-rot sur grappes peuvent se produire après la véraison jusqu'aux vendanges; il est donc nécessaire de poursuivre la protection des vignobles au-delà de la véraison.

## OIDIUM

Comme indiqué dans notre précédent bulletin, en raison des conditions climatiques favorables, l'oïdium s'est localement fortement développé. Dans le Haut-Poitou les manifestations sur grappes et parfois feuilles sont fréquentes. Les conditions climatiques restant très favorables à cette maladie qui peut attaquer les grains jusqu'à la véraison, il est recommandé d'effectuer un poudrage dans les parcelles sensibles.

## BOTRYTIS

A la suite de la récente période pluvieuse, les premiers foyers de pourriture grise sur grappes viennent d'apparaître. Nous rappelons les indications, concernant la lutte contre cette maladie, données dans le supplément n°1 du Bulletin n° 142 de Juillet, et que les stades de la fermeture des grappes (atteint depuis quelques jours), de la véraison (qui ne saurait tarder) sont essentiels dans la lutte.

Dans les vignobles touchés par l'oïdium l'utilisation de Bénomyl ou de Dichlofluanide sera également efficace contre cette dernière maladie.

## VERS de la GRAPPE

Dans les Charentes le vol est pratiquement terminé et les attaques sont peu importantes et irrégulières. Surveiller les vignes et intervenir si nécessaire.

Dans le Haut-Poitou le vol des papillons a été très actif du 27 Juillet au 7 Août, mais se poursuit encore avec une <sup>très forte</sup> intensité. Des pontes assez nombreuses ont été déposées au cours de ces derniers jours.

En outre l'efficacité du traitement précédemment conseillé est devenue pratiquement nulle, surtout après les récentes pluies. Il convient donc d'assurer, dès réception, une nouvelle protection notamment dans les secteurs sensibles.

.../...

786



POMMIERS - POIRIERSCARPOCAPSE

Dans les Charentes où le deuxième vol se poursuit, il convient d'effectuer dès réception un nouveau traitement si la protection des fruits n'a pas été renouvelée au cours des derniers jours à la suite du lessivage provoqué par les pluies du 7 au 15 Août.

Dans le Poitou et notamment en Gâtine, le deuxième vol qui a débuté à la fin de la première décade du mois, présente une très faible intensité, la première génération ayant été retardée par le printemps froid. En conséquence les risques d'attaques actuels doivent être nuls dans les vergers de grande surface isolés. Par contre dans les parcelles de moindre importance situées à proximité soit d'arbres de plein vent non ou insuffisamment protégés, soit de vergers délaissés, il convient d'effectuer dès réception un traitement.

ARAIGNEES ROUGES

Les populations d'acariens sont très variables selon les vergers et les traitements effectués. Se reporter aux indications du précédent bulletin.

PUCERONS VERTS

Quelques foyers de pucerons verts sont observés actuellement. Dans les vergers infestés, intervenir avec un aphicide ou si besoin est avec un produit actif en même temps contre le carpocapse (voir le bulletin n° 139 d'Avril).

MALADIES de CONSERVATION

Il est nécessaire d'effectuer plusieurs traitements fongicides avant la récolte afin d'éviter les contaminations possibles par des champignons responsables des maladies de conservation. La période actuelle semble assez favorable à ces contaminations en raison du développement des fruits et du temps instable. Il est donc recommandé d'effectuer un traitement, dès qu'une nouvelle période pluvieuse sera annoncée, avec l'un des produits suivants : Bénomyl, Captane, Thiabendazole.

OIDIUM

Les conditions climatiques actuelles sont favorables au développement de ce cryptogame. Profiter des traitements contre la tavelure ou maladies de conservation pour poursuivre la lutte contre l'oïdium.

CHOUXPIERIDE

Un nouveau vol de piéride du chou est en cours et les premières attaques peuvent déjà être constatées dans certaines parcelles. Surveiller les cultures pour suivre l'apparition des premières attaques et intervenir par pulvérisation ou poudrage en utilisant l'un des produits suivants : malathion, parathion, phosalone ... Ce traitement sera également efficace contre les petites altises très fréquentes dans les cultures.

POIREAUXROUILLE

Des attaques de rouille sont constatées sur certaines parcelles de poireaux. Dès les premières taches, intervenir par pulvérisation d'une bouille à base de : mancozèbe (240 g/MA/hl), ou manèbe (160 g/MA/hl) ou propinèbe (210 g/MA/hl).

TEIGNE

Le troisième vol est commencé. Intervenir dès que les toutes premières attaques seront constatées. Ce traitement sera également efficace contre les thrips encore localement abondants.

—oo—0—oo—

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire  
" Poitou-Charentes "

F. BARBOTIN

Les Ingénieurs Chargés des  
AVERTISSEMENTS AGRICOLES  
A. GRAVAUD  
R. HUDE - H. BOUE